

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO DE EXPLOTACION AGROPECUARIA - IMPLANTACION DE PASTURAS BAJO EL SISTEMA SILVOPASTORIL (GANADERIA) Y SISTEMA DE RIEGO ARTIFICIAL EN PASTURAS IMPLANTADAS, PROPIEDAD DE LOS SRES. AGROGANADERA CONCEPCION S.A., ADRIANA MABEL SKAF DE GAUTO, RAUL ERNESTO GONZALEZ GONZALEZ, JORGE WILFRIDO CASASNOVAS BENÍTEZ, ALBERTO NICOLAS CASASNOVAS BENITEZ, ESTANISLAO DOMÍNGUEZ GARCETE, EN EL LUGAR DENOMINADO Paraje Fortín Florida, DISTRITO DE Fuerte Olimpo, DEPARTAMENTO DE Alto Paraguay, MATRICULAS N° R01-852, R01-388, R01-189, R01-188, R01-202, R01-199, R01-207, R01-200, R01 361, R01-363, R01-362 PADRONES N° 1.895, 1.649, 1.474, 1.478, 1.488, 1.486, 1.487, 1.485, 1.216, 1.226, 1.229 DEL CHACO

INTRODUCCION

Este **Relatorio de Impacto Ambiental** fue elaborado en forma concisa y concentrado en los problemas ambientales significativos que pueden verificarse en la realización de las actividades previstas en el proyecto de explotación agropecuaria.

OBJETIVOS

General

El objetivo de toda evaluación ambiental es determinar qué recursos naturales van a ser afectados por la actividad a ejecutarse, para de este modo tomar las medidas tendientes a mitigar o eliminar los impactos negativos que podrían verificarse.

En el marco de la mencionada expresión, el alcance de la evaluación ambiental que se entrega en este documento técnico, se circunscribe a estudiar el área a ser intervenida y las incidencias derivadas de las actividades que se van a ejecutar en el sitio de ejecución y en áreas adyacentes.

Por tanto y bajo tales expresiones los objetivos son:

- Presentar de manera semi detallada los principales componentes del **Plan Desarrollo de Implantación de Pastura**, las inversiones previstas, los eventos de producción, los requerimientos financieros y la factibilidad física y económica.
- Identificar y estimar las alteraciones posibles del medio ambiente local.
- Analizar las incidencias positivas o negativas sobre los factores ambientales, a corto y largo plazo, de las actividades a ejecutarse en las diferentes etapas del plan.

● Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación a ser aplicadas para reducir o eliminar los impactos que podrían surgir con la ejecución del plan

ÁREA DEL ESTUDIO

Basados en los documentos disponibles como título de propiedad, carta topográfica, imagen satelitaria, en identificaciones realizadas en gabinete y su posterior verificación en el campo, queda definido que la propiedad está ubicada en la cercanía del lugar conocido como *Paraje Fortín Florida*, Distrito de *Fuerte Olimpo*, Departamento de *Alto Paraguay*. Las coordenadas geográficas del vértice SUR OESTE de la propiedad en UTM son aproximadamente las siguientes: 275.258 de Latitud (Este) y 7.734.621 de Longitud (Norte).

Acceso (ubicación): Se accede a la propiedad por la ruta Presidente Carlos A. López (Transchaco) hasta el Km. 440 (localidad de Filadelfia), desde este punto se recorren unos 300 Km. aproximadamente por el camino que conduce a Tte. Montania y de ahí a Madrejón al lado izquierdo siguiendo desde Tte Montania a unos 186 km de Filadelfia, en las coordenadas geográficas UTM E 0202923-N 7.692.263, en este punto se dobla al lado derecho por un camino privado recorriendo por este tramo se encuentra el Puesto de control llamado Tupasy Renda en las coordenadas geográficas UTM E 0253397-N 7.713.299, se pasa por este puesto hasta alcanzar otro puesto de control y se gira a la derecha pasando por la central de Agroganadera Concepción y a unos 8 km de este, se encuentra el portón de entrada a la propiedad.

Según escritura de titulación, la superficie total del predio es de 33.389,3858 Ha.

Área de Influencia Directa

El área de influencia directa del proyecto está constituido, principalmente por las áreas a ser intervenidas mediante la eliminación del sotobosque y la implantación de gramíneas forrajeras en su reemplazo en una superficie de **2.872,7** ha y, otras áreas colindantes a estas, ya que en forma directa serán impactadas las especies vegetales en el área a intervenir mecánicamente, lo mismo ocurrirá con las especies animales que viven en la zona, por pérdida de territorio, aunque ésta trascendiendo un poco más el lugar mismo del proyecto. A pesar de los efectos negativos citados, **el plan también traerá beneficios significativos al área debidos, principalmente por la habilitación de fuentes de aguas en los bebederos a ser distribuidos en los diferentes potreros, dotando al área del elemento vital para la vida de los animales, tanto domésticos como silvestres.**

En el área del proyecto no existe ningún cauce hídrico permanente definido, solo existen cauces de desagües de aguas de lluvias en forma de cañadones, por consiguiente, se vuelve difícil definir el área de la microcuenca en la que se halla enclavada la propiedad, así como su divisoria de aguas, circunstancias que no ha ayudado para establecer claramente el área de influencia directa; la que estaría dada principalmente por los espacios intervenidos y los de vegetación nativa adyacente.

Área de Influencia Indirecta

Desde el punto de vista biológico, el proyecto tendrá incidencias moderadas en la fauna del **Paque Nacional ~ Fortín Defensores del Chaco** y será por la presión que ejercerán las especies de la fauna nativa directamente impactadas por la pérdida o reducción de su territorio.

El área protegida más cercana es el Parque Nacional mencionada con 780.000 ha cuyos límites se encuentran en línea recta aproximadamente 60 Km. al noroeste del área objeto de este estudio. Desde el punto de vista socioeconómico, la ejecución del proyecto tendrá incidencia positiva directa en varios sectores de la población económicamente activa de la región ya que el mismo requerirá de la participación de abundante mano de obra para la ejecución de los diferentes eventos del proyecto. Así se requerirán de mano obra para la elaboración de postes, instalación de alambradas, construcciones rurales varias, limpieza de potreros, el manejo del ganado y otros.

También serán requeridos la prestación de servicios de transporte para el acarreo de materiales, el transporte del ganado. Se puede indicar que con la puesta en marcha del proyecto serán beneficiados los pobladores regionales, lo mismo que las localidades de Filadelfia, Loma Plata, y Newland y por la adquisición de bienes y servicios. Asunción se verá afectada por la comercialización del ganado y varios otros sectores por la distribución de los ingresos generados.

En anexo se presentan el área de ubicación e informaciones adicionales de apoyo.

Descripción de las actividades propuesta

El proyecto hace referencia a la **implementación dentro de** la legislación ambiental nacional de las **actividades** ganaderas a ser desarrollada en una superficie total de **33.389,3858** hectáreas, con el propósito de implementar a futuro inmediato en ella técnicas y actividades de producción en el marco de la equidad económico, social y ambiental a nivel local.

Actualmente en la propiedad, se desarrolla actividad ganadera de tipo tradicional a través de la cría, en menor escala, la recria y engorde de

ganado sustentado con pasturas naturales y pequeña porción implantadas y con aprovisionamiento de agua mediante tanques, tajamares, pozo artesiano y distribuido a través de cañerías a bebederos ubicados en los potreros. Se **prevé desarrollar el área de pasturas y aumentar el número de tajamares** a modo de intercomunicar los potreros para consumo de los ganados.

El proyecto comprende la habilitación de terreno para la implantación de pastura para la cría y recría del ganado vacuno y que comprenderá las siguientes operaciones:

- Planificación de las actividades previas.
- Delimitación del área a intervenir.
- Marcación de árboles que quedarán dentro de la parcela.
- Destronque (Limpieza del Sotobosques).
- Apilado y acomodo de los restos de vegetación para su descomposición natural.
- Construcción de tajamares y bebederos para el ganado (Pozo artesiano).
- Empotreroamiento de la zona habilitada.
- Implantación de pastura con especies adecuada para la zona.
- Carga, manejo y cría del ganado vacuno de la raza Nelord, Brangus, Brahmán.
- Traslado del ganado para su comercialización.

Todas estas actividades estarán enmarcadas la Ley N° 3464/08 Que crea el Instituto Forestal Nacional (**INFONA**) y administra la Ley 422/73 y su decreto reglamentario N° 3929/10, Decreto de Protección Ambiental N° 18.831/86 y demás disposiciones legales que rigen las actividades forestales y ambientales del país.

Los **responsables de la firma AGROGANADERA CONCEPCION S.A.**, propietaria del inmueble en cuestión, en forma complementaria a las actividades de Producción *Pecuaría*, pretenden ahora de realizar una ampliación de sus actividades e implementar un **sistema de riego artificial** de Pasturas Implantadas en una **SUPERFICIE de 217,0 Ha** con el fin de optimizar recursos y dar un uso sustentable del agua que dispone y almacenado en los tajamares, la misma tiene por objeto obtener un alto rendimiento de pastos para **fardos o heno** la misma tendrá que ser suministrada en temporada crítica de pastos y así tener suficiente alimentos para todo el tiempo del año.

En cuanto a las tecnologías y procesos a ser aplicados para las actividades con sistema de riegos mencionadas, se destacan las siguientes que son expuestos a continuación:

Se aplicarán tecnologías apropiadas en la preparación de terreno y en la siembra, utilizando solo en algunos casos maquinarias especiales, de tal forma a no remover excesivamente la materia orgánica del horizonte

superficial y remanentes de cultivo anterior porque la plantación se realizará por el sistema de siembra directa.

Se mantendrán dispersados los restos de vegetación de la plantación anterior para evitar o atenuar la erosión hídrica y pérdida acelerada de la fertilidad del suelo, se dejarán que se descomponga naturalmente.

La siembra se realizará en forma mecanizada y cuando se dispone de buena humedad en el suelo, condición indispensable para lograr una buena y uniforme germinación de las semillas.

Sistema y captación de agua para riego artificial

Se tiene un sistema de almacenamiento de agua muy bien estructurado con capacidades de diferentes dimensiones con un tanque elevado con 100.000 m³ de capacidad y los tajamares alimentadores 3 unidades cada una coapacidad de 200.000 m³ y otro colector de 400.000 m³. Esta infraestructura será utilizada para el bombeo y alimentar el sistema pivot central con giro de 360°.

Sistema de Pivot Central

Esta unidad de sistema riego, es por aspersión automática, PIVOT CENTRAL, marca VALLEY, modelo 4871 - 8000 - VSL / 10 - 2.086, propulsión eléctrica, 10 torres accionadoras, alcance total 592,98 m; área circular irrigada 110,47 ha; altura libre entre las torres en terreno plano: Standard - 2.74m.

Descripción

- 1 torre central 6.5/8" / 8.5/8" x 2.7m
- 8 conj. tubos de descenso flexible tiro largo
- 2 conj. tubos de descenso flexible tiro extra largo
- 1 conj. tubos de descenso flexible p/oscilar 25m
- 1 pivot tiro largo inicial 8.5/8" x 2.7m
- 7 pivot tiro largo interm. 8.5/8" x 2.7m
- 1 pivot tiro extra largo -interm. 6.5/8" x 2.7m
- 1 pivot tiro largo final 6.5/8" x 2.7m
- 1 conj. Oscilación 25m
- 1 panel principal pro2 c/kit lig.bomba inyección
- 9 alineación alta sensibilidad
- 2 iluminación de señalización valley
- 1 escalera torre central - pivot standard
- 1 conj. tubos de descenso flexible spray final
- 1 gerenciamiento y manejo de agua
- 6 conj. inferior pista seca 6.5/8"
- 18 conj. inferior pista seca 8.5/8"

1 kit de aspersión tipo i wob c/ peso c/ reguladores senninger 10 psi para 473,44 m³/h

Características de la Motobomba para el bombeo del resorborio de los tajamares

Quant. Descrição

CONJ. MOTO BOMBA

4 MOTOR ELET.AR TRIF.IV P.1450RPM 40 CV 50HZ

4 BOMBA CENTR.IMBIL ITA 100-500/2

4 LUVA ELASTICA E-148

4 BASE FIXA FERRO F- 75

Quant. Descrição

DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS

4 CONVERSOR MONOF./TRIF.37,5KVA 220/220V

1 TRAF0 CONVERSOR MONOF./TRIF.15KVA 220/500V

970 CABO ENERGIA BWF ISOLAMENTO 750V COBRE 2 X 2,5MM2

970 CABO ENERGIA ISOLAMENTO 1KV COBRE 3 X 16MM2

1 ATERRAMENTO PIVOT/REBOCAVEL

180 CABO ENERGIA ISOLAMENTO 1KV COBRE 1 X 70 MM2

240 CABO ENERGIA ISOLAMENTO 1KV COBRE 1 X 16 MM2

Quant. Descrição

LIGAÇÃO DE PRESSÃO E SUÇÃO

4 TUBULACAO SUCCAO AZ FL 8" X 5M

4 TUBO AZ FLANGE 8" X 6.0M

4 RED.EXC.AZ FL XFL 8" X 4"(ANSIB.16-1/2534/2535)

4 MANOMETRO E TORNEIRA (0 - 20KGF/CM2) C/ESCORVA

4 CURVA SAIDA AZ FL 5" X 90° (DIN 2502)

4 PECA AUM.AZ FLXFL 4" X 5"(DIN 2502/32/33)

4 CONJ.REGISTRO GAVETA FL 5"

4 TUBO AZ FLANGE 5" X 3.0M (DIN 2502)

8 CURVA AZ FL 5" X 60°

4 TUBO AZ FLANGE 5" X 1.0M

4 TUBO AZ FLANGE 5" X 2.0M

4 CONJ.VALV. RETENCAO BY-PASS FL 5"

8 COLARINHO DE 150MM C/FLANGE DIN2532/PARAFUSO/PORCA

8 TUBO PEAD PN08 DE 150MM X 6.0M

Quant. Descrição

ADUTORA

1 PECA AUM.AZ FLXFL 5" X 10"(DIN 2532/2533)

2 EXTREM.FL X BOLSA 10" X 250MM C/VEDACAO(DEF0FO)

170 TUBO PVC PN60 JE 250MM X 5.8M(DEF0FO) EXPORT

Quant. Descrição

LIGAÇÃO DO PIVOT

2 CURVA AZ FL 10" X 60°

2 TUBO AZ FLANGE 10" X 1.5M

1 PECA AUM.AZ FLXFL 8" X 10"(DIN2532/B-16.1)

La implementación de las actividades previstas indudablemente traerá un impacto económico positivo para el Distrito de *Fuerte Olimpo* en particular y para el país en general, pues significará mano de obra e ingresos de divisas.

Al respecto se entregan informaciones de la distribución y superficie del uso actual de la propiedad basada en imagen satelital del lugar, las cuales han servido de base para la formulación del uso propuesto (futuro). En anexo puede apreciarse los mapas respectivos.

TABLA 1. Uso de la tierra

Distribución	Uso actual		Uso propuesto		
	Superficie		Distribución	Superficie	
	ha	%		ha	%
Bosque	11.702,7	35,3	Bosque de reserva	7.281,2	21,9
Campo natural	4.153,0	12,5	Campo natural	4.153,0	12,5
Franjas de separación	3.584,3	10,8	Franja de separación	4.644,1	14,0
Pastura implantada	13.224,7	39,9	Pastura implantada	12.475,1	37,6
Sistema de riego artificial	217,0	0,6	Bosque de protección	488,9	1,5
Caminos, sede, tajamar	292,6	0,9	Área a Habilitar	2.872,7	8,6
			Regeneración p/franjas	400,8	1,2
			Regeneración p/cauces	384,1	1,1
			Sistema de riego artificial	217,0	0,7
			Caminos, sede tajamar	287,4	0,9
Total	33.174,3	100,0	Total	33.174,3	100,0

Esta distribución de uso está enmarcada dentro de las estipulaciones técnicas y legislativas (forestales y ambientales) vigentes en el país y el bosque de reserva es el 25,1% del bosque original (29.021,3 ha).

Uso actual de la tierra

Agropecuario: Unas 12.475,1 hectáreas se encuentran cubiertas por pasturas cultivadas de la especie Adaptada al Sitio (Gattonpanic (*Panicum maximun* var. Gatton). Esta superficie cuenta con franjas de protección eólica entre parcelas intervenidas y llega a una superficie de 4.644,1 hectáreas los que representa el 14,0 % del total del predio.

Uso alternativo de la tierra

Bosque de reserva: El Uso alternativo de la Tierra previsto en el Plan contempla que de las **33.174,3** ha que posee la finca, **7.281,2** ha (21,9 de la propiedad y 25,1% del bosque original (29.021,3 ha)) quedaran como área no intervenida o bosque de reserva. El área de reserva cumplirá la función de refugio y hábitat de la fauna silvestre y banco de germoplasma de la vegetación nativa. También cumplirá la función de regulador de manifestaciones climáticas extremas.

Implantación de Pastura: Superficies asignadas a la implantación de nuevas pasturas bajo el uso del sistema silvopastoril contemplan **2.872,7** ha, el **8,6%** del predio. Esta superficie constituye el recurso básico y fundamental del proyecto ya que constituirá la base de la explotación ganadera.

Franjas de separación (protección eólica): El plan tiene asignado una superficie de 4.644,1 ha, el 14,0% del predio que permanecerá como franjas de protección eólica y resguardo para animales entre parcelas desarrolladas con pasturas bajo el uso del sistema silvopastoril. El área a intervenir como pastura representa el 8,6% de la superficie total del predio, mientras que las superficies no intervenidas, el área de reserva, las franjas de protección representan los 35,9%.

Personal e inversiones

Conforme a las actividades en el marco del desarrollo del Proyecto de Explotación Ganadera, y en lo referente a datos sobre personales e inversiones las mismas son detalladas los requerimientos a continuación en las siguientes Tablas:

TABLA 2. Infraestructura física proyectada

Infraestructura	Descripción	Valor estimado (US\$)
Alambrados	167 Km. a US\$ 1.500 /Km.	250.500
Corral	1 unidad	35.700
Aguadas	Tanque (8) y bebederos (160)	140.000
Pastura a implantar	2.872,7 ha a US\$ 177 /ha	508.467
Caminos internos	28 Km. a US\$ 3000 /Km.	84.000
Vivienda	1 unidad	25.000
TOTAL		1.043.667

* Cotización del dólar 1: 5.700

TABLA 3. Recursos humanos

Descripción	Cantidad		
	Actual	Proyectado	Total
Directivo	1		1
Administrativos			
Veterinario	1		1
Operadores permanentes			
• Comisario	1		1
• Capataz	1		1
• Estancieros	2		2
• Tractorista	1		1
• Ayudante de cocina	1		1
Operadores transitorios	3		3
TOTAL	12		12

Descripción del medio ambiente

En este apartado se reúnen, se evalúan y se presentan datos de línea de base de los componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales relativos al medio ambiente local.

Medio físico

Geología

El gran Chaco es una cuenca epicontinental que fue llenado en el transcurso del desarrollo histórico de la tierra con diferentes sedimentos. La capa más baja está compuesta por sedimentos marinos de más de 2.000 m. de espesor, depositadas durante el Silurico y el Devónico, encima de los cuales siguen sedimentos continentales rojizos de 500 a 2.500 m. de espesor que se denomina *Red Beds*. (Cama roja). Encima de estos *Red Beds*, se encuentran jóvenes piedras continentales semi o no compactadas del Neozoico, con un espesor de hasta 500 m. que representan el actual material base del suelo chaqueño.

El área de estudio está comprendida dentro de una planicie de deposición permanente de sedimentos transportados por agua, cuyo origen, edad y características son homogéneos.

El valle actual y cauces temporarios reciben continuamente sedimentos depositados por las aguas de las crecientes de ríos, riachos y arroyos. Esto indica que los sedimentos de las citadas posiciones son de edad reciente del cuaternario y se formaron después del periodo glacial por los efectos del agua y del viento, representando el actual material base del suelo. Estos sedimentos son relativamente uniformes a través de grandes extensiones de suelo y están formados por materiales de textura fina. Por las características de las deposiciones periódicas y en superficies

relativamente planas, las estructuras de los materiales son predominantemente de forma laminar y en bloques.

La textura predominante dentro de la propiedad es el franco arcillo arenosa, franco arcilloso y en zonas localizadas, franco arenoso, franco limoso y arcillo limosa. En las posiciones topográficas más altas, terrazas altas y albardones de paleocauces, dominan los sedimentos areno-limosa del tipo loes y limosa muy desagregado, con bajo tenor de arcilla y materia orgánica.

Relieve

La zona paraguaya del gran chaco es una llanura sedimentaria plana, ubicada frente a los Andes, con poca caída desde el Noroeste hacia el sudeste. El relieve puede ser designado como extremadamente plano, de tal manera que en la mayor parte del Chaco paraguayo faltan colinas u ondulaciones del terreno.

En épocas de lluvias, octubre-marzo, se registra un ligero escurrimiento del agua superficial mediante cauces naturales que periódicamente llevan agua en dirección este-sudeste. Debido al poco declive del Gran Chaco y el relieve regular, el agua de lluvia se junta en muchas partes en bajadas sedimentales con diámetros de varios kilómetros. La mayoría de estas acumulaciones de agua evaporan en el transcurso de la época seca, con lo cual las sales disueltas de los años anteriores, otra vez se concentran localmente.

El relieve general del área de estudio se caracteriza por suaves lomadas, con pequeña inclinación, no sobrepasando el 1%.

Suelos

Taxonomía de suelos

La distribución espacial de las clases taxonómicas de suelos existentes en el predio, con sus respectivas caracterizaciones se presenta a continuación.

TABLA 4. Asociaciones de suelos encontrados

Símbolo	Asociación de unidades de suelo	Superficie	
		Ha	%
SNh/SNg	Solonetz háplico/Solonetz gleico	7.603,0	22,8
LVh/GLe	Luvisol haplico/Gleysol eutrico	7.466,2	22,4
SNg/SNh	Solonetz gleico/Solonetz haplico	2.234,6	6,7
LVh/CMe	Luvisol haplico/Cambisol eutrico	8.043,3	24,2
SNg/GLe	Solonetz gleico/Gleysol eutrico	3.158,9	9,5
SNg/SCn	Solonetz gleico/Solonchaks sódico	2.838,0	8,5
CMe	Cambisol eutrico	1.216,8	3,7

GLe	Gleysol eutrico	728,4	2,2
Total		33.289,2	100,0

Aptitud de Uso de la Tierra

Conforme a los estudios derivados del procesamiento de datos e informaciones de campo y gabinete, el área en consideración presenta la aptitud de uso de la tierra para un nivel tecnológico II conforme a los valores presentados en la siguiente Tabla:

TABLA 5. Aptitud de Uso

Clase de suelo	Nivel Tecnológico	Aptitud de uso de la tierra	Superficie	
			ha	%
Buena	NT II	1A ₁ 2P 3S ₂ 4N S ₁	7.603,0	22,8
	NT II	2p 3S ₂ 4N S ₁ 5a ₁	2.234,6	6,7
	NT II	2p 3S ₂ 4N S ₁	8.043,3	24,2
Moderada	NT II	6p 7S ₂ 8n S ₁	8.683,0	26,1
	NT II	6p 8n	3.158,9	9,5
Restringida	NT I	10 (p) 12 (n)	2.838,0	8,5
No apta		13 Rp	728,4	2,2
Total			33.289,2	100,0

En base a lo expuesto, las tierras de la propiedad en estudio, han sido clasificadas conforme a su aptitud de uso, tal como se presenta a continuación:

Clase buena: Son tierras de las áreas con topografía más alta de la propiedad, con una superficie de alrededor de **17.880,9 hectáreas**, lo que representa el 53,7% del área total. No tiene limitaciones significativas para la producción sostenida de un determinado tipo de explotación, bajo el nivel de tecnología aplicada. Hay un mínimo de restricciones que no reducen los beneficios expresivamente y no aumentan los insumos encima de un nivel aceptable. Estas áreas pueden utilizarse, tal como se presenta en el mapa de aptitud de uso con 1A₁ 2P 3S₂ 4N S₁, 2p 3S₂ 4N S₁ 5a₁ y 2p 3S₂ 4N S₁.

Clase moderada: Son tierras que ocupan zonas con topografía plana y de lomada, cubriendo una superficie de alrededor de **11.841,9 hectáreas**, lo que representa el 35,6% del área total. Tienen limitaciones moderadas para la producción sostenida de un determinado tipo de explotación bajo el nivel tecnológico aplicado. Las limitaciones reducen la productividad o los beneficios aumentando la necesidad de insumos para elevar las ventajas que son sensiblemente inferiores a la que se consigue con las tierras de clase buena. Estas áreas pueden utilizarse, tal como se presenta en el mapa de aptitud de uso, con 6p 7S₂ 8n S₁ y 6p 8n.

Restringidas: Son tierras de las zonas bajas de la propiedad y cubre una superficie de aproximadamente **2.838,0 hectáreas**, que representa el 8,5% del área total. Tienen limitaciones fuertes para la producción sostenida de un determinado tipo de explotación bajo el manejo considerado. Las limitaciones reducen la productividad o los beneficios o aumentan los insumos necesarios al desarrollo de tal manera que los costos se tornan marginales para su utilización. Estas áreas pueden utilizarse, tal como se presenta en el mapa de aptitud de uso, con 10 (p) 12 (n).

Clima y elementos climáticos

Según el sistema de clasificación climática de Thorntwhite, el clima local corresponde al Semi Árido Megatermal (DA`da`) con lluvias de verano. La precipitación media anual es de 900 a 1000 mm distribuidas en un 80 % entre octubre y mayo y en un 20 % entre junio y septiembre. La evaporación potencial es de 1.350 mm anuales, y el Balance Hídrico anual es de 500 mm negativo. Las características del relieve plano ligeramente ondulado con muy escasa pendiente y el suelo de textura franco arcillo arenosa permeabilidad moderada, predominantes en los bosques bajos (Palosantal/labonal), determina que, en los periodos lluviosos del año, ciertas extensiones del terreno permanecen inundados por tiempos variables. La temperatura media anual es de 24°C a 25°C con vientos predominantes del sector norte.

Flora

La vegetación existente corresponde a la Unidad Xerofítica, y se diferencian dos formaciones clasificadas como Bosque Xerofítico medio a bajo. El estrato medio, de baja densidad, está constituida por Quebracho blanco, palo blanco, Labón, Palo Santo, Guayaibí say ju, el estrato medio a bajo integrado por Mistol, Carandá, Guayacán, y un estrato arbustivo, de mayor densidad, compuesto por Guaiguí piré, Yukerí, Lengua Cumandá, Yagureté Nambí, Payagua Naranja, Verde Olivo.

Según Holdrige la formación boscosa del área corresponde al *Bosque Templado – Cálido seco*. Según Gueck y Seibert, el área corresponde al tipo de bosque seco del Chaco central, en tanto que según Lucas A. Tortorelli, la formación del bosque corresponde al *Parque Chaqueño*.

Las especies de flora identificada, entre otras, son las indicadas en la Tabla siguiente:

TABLA 6. Flora identificada en la propiedad

Formación	Vegetación	Especies identificadas	Nombre común
Bosque	Estrato arbóreo	<i>Bulnesia sarmientoi</i>	Palo santo
		<i>Aspidosperma quebracho blanco</i>	Quebracho blanco
		<i>Patagonula americana</i>	Guayayvi
		<i>Bumelia opstusifolia</i>	Guayayvi raí

Templado Cálido-seco		<i>Tabebuia nodosa</i>	Labón
		<i>Calycophyllum multiflorum</i>	Palo blanco
		<i>Caesalpinia paraguariensis.</i>	Guayakan
		<i>Prosopis kunzei</i> Harns	Karanda
		<i>Phyllostylon rhamnoide</i>	Palo lanza
Estrato arbustivo		<i>Ruprechtia triflora</i>	Guaimi pire
		<i>Cercidium praecox</i>	Verde oliva
		<i>Acacia polyphylla</i>	Yukeri
			Pajagua naranja

Fauna

La existencia aún de bosques de ciertas superficies evidencia la alteración estructural del hábitat original de la fauna, lo que presupone que la población residente original de fauna silvestre se halla muy reducida y algunos de ellos ocupan los mismos territorios. Para toda la zona se citan especies de fauna en peligro crítico, como lobo pé, arira'y, yaguareté, guazú pucú, guazúti, tucá guazú, yacaré overo, mboi jagua, entre otras.

TABLA 7. Fauna identificada en la región

Nombre científico	Nombre común	Nombre científico	Nombre común
<i>Agouti paca</i>	Tañicatí	<i>Marmosa grisea</i>	Mykure, comadreja
<i>Ameiva ameiva</i>	Lagartija, teju asaje	<i>Mazama gouazoubira</i>	Guasuvirá
<i>Trogon rufus</i>	suruku'a ju	<i>Megarhynchus pitangua</i>	Nei nei
<i>Athene cunicularia</i>	Urukurea un, urukure'a	<i>Milvago chimachima</i>	Kirikiri
<i>Bubo virginianus</i>	Ñacurutú guasú	<i>Molossus molossus</i>	Mbopi
<i>Bubulcus ibis</i>	Garcita bueyera	<i>Molothrus bonaeriensis</i>	Guyrau
<i>Coragyps atratus</i>	Yryvu hu	<i>Mycteria americana</i>	Tujuju kangy
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Había verde	<i>Myiopsitta monachus</i>	tu'i, cotorra
<i>Dasybus novemcinctus</i>	tatu hú	<i>Nasua nasua</i>	Kuatí
<i>Vampyrops lineatus</i>	mbopi, vampiro	<i>Ortallia canicollis</i>	Charata
<i>Euphractus sexcinctus</i>	Tatpú poju	<i>Otus choliba</i>	Urukure'a mi
<i>Felis concolor</i>	Puma, jagua pyta	<i>Panthera onca</i>	Jaguareté, jaguar
<i>Felis pardalis</i>	Jaguarete'i, gato onza	<i>Pardaria coronata</i>	Cardenal
<i>Felis wiedii</i>	Margay, yaguarete'i	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión
<i>Felis yagouaroundi</i>	Yaguarundi	<i>Piccumnus temninckii</i>	Ypeku'i
<i>Hyla bivittata</i>	Ju'i, rana	<i>Polyborus plancus</i>	Caracará
<i>Iguana iguana</i>	Iguana verde	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Taguato caracolero
<i>Jabiru mycteria</i>	Tujuju cuartelero, jabiru	<i>Tayassu pecari</i>	Tañy catí
<i>Catagonus wagneri</i>	Tagua	<i>Tayassu tajacu</i>	Kure'i
<i>Tigrisoma fasciatum</i>	Hoko hovy	<i>Theristicus caudatus</i>	Kurukau ajura sayju
<i>Troglodytes aedon</i>	Masacaraguai	<i>Vampyrops dorsalis</i>	vampiro, mbopi
<i>Tyrannus savana</i>	ruguai yetapa	<i>Vanellus chilensis</i>	teru teru

Presencia de parcialidades indígenas

Las comunidades indígenas que habitan en el Departamento de o el Chaco Central, son Ayoreo, Lengua, Chiriguano y Nivacle. La mayor parte de los

indígenas se encuentran asentados en el área de influencia de Mariscal Estigarribia, Filadelfia y Loma Plata, zonas en las que pueden acceder a trabajos remunerados, servicios médicos y asistencia en general, por parte de los menonitas o instituciones instaladas en estas ciudades.

Algunos impactos ambientales inherentes a proyectos de desarrollo pecuario.

En la tabla siguiente se presenta un listado de los posibles impactos que afectarían a diferentes recursos del medio como consecuencia de la ejecución del plan de desarrollo propuesto.

Tabla 8. Algunos impactos determinados para proyectos de inversión pecuaria-Matriz de Impactos ambientales

<i>Actividad de desarrollo</i>	<i>Cambio en el sistema Natural</i>	<i>Impacto, en salud y bienestar humano</i>
Habilitación de la tierra para implantación de pastura.	Eliminación del sotobosque, con su consecuente disminución de la vegetación natural en el área. Desplazamiento o reducción de la fauna por la reducción del hábitat Interrupción de las rutas migratorias Competencia por los recursos alimenticios Introducción de enfermedades Impactos de la quema Mayor cacería ilegal, y matanza de la fauna por ser considerada como plaga o depredadora del ganado	En la población nativa, disminución de su hábitat. Menor recurso alimenticio. Disminución de biodiversidad y los beneficios derivados de esta. Nutrición, aislamiento. Incremento del bienestar del hombre por ingresos derivados de la producción ganadera.
Implantación de pasturas	Cambios en la vegetación y la fauna. Simplificación del ecosistema Deterioro de las características físicas y químicas del suelo: Durante el cambio de la vegetación y el uso posterior de la pastura. Mayor erosión y compactación del suelo	Vulnerabilidad a pestes. Disminución de vida silvestre. Incremento de cantidad de ganado bovino. Mayores ingresos económicos
Roturación indiscriminada de la tierra	Disgregación y compactación de suelo. Pérdida de sombra y especies forestales. Conversión a pasturas. Erosión eólica.	Perdida de productividad del suelo.
Sobrecarga animal	Degradación de los recursos vegetales debido al pastoreo excesivo. Mayor erosión del suelo debido al desbroce del suelo y pisoteo de la vegetación. Compactación del suelo. Incremento de malezas.	Menor productividad de las pasturas y del ganado.
Construcción de tanques australianos y tajamares	Extracción de agua subterránea potable para la fauna nativa y para el ganado de explotación	Significativo beneficio para la fauna nativa por la abundante y permanente disponibilidad de agua.
Colocación de bebederos	Degradación de la vegetación y el suelo alrededor de las fuentes de agua. Mayor flujo del agua superficial debido al desbroce de la vegetación y la compactación del suelo (menor capacidad de infiltración).	Significativo beneficio para la fauna nativa por la abundante y permanente disponibilidad de agua distribuidos en todos los potreros por medio de bebederos.
Control de plagas y enfermedades	Contaminación ambiental, trastornos ambientales, peligros para la salud, debido a las medidas usadas para controlar plagas y enfermedades.	Disminución de biodiversidad. Dependencia de productos químicos. Contaminación por residuos.
Razas mejoradas	Reducción de la variedad genética a raíz de la selección. Razas más productivas menor resistencia ambiental.	Mayores riesgos en los resultados productivos.
Quema irracional	Efectos negativos de la quema incontrolada de los matorrales, para el suelo y la vegetación (deterioro de la fertilidad del suelo y su estructura, alteración del hábitat de la fauna, destrucción de la vegetación).	Contaminación del aire. Pérdida de productividad del suelo.

Plan de mitigación - Recomendaciones Generales de Manejo.

A continuación, se presentan los aspectos centrales previstos en el plan de desarrollo, de tal forma a prevenir los efectos negativos de los impactos relacionados a la ejecución del plan.

Reserva forestal.

El proyecto prevé la existencia de un área no intervenida para refugio de la vida silvestre de **6.487,9** ha (33,1% de la superficie del predio y 38,9% del área de bosque original), compuesta de un área de bosque continuo de

4.173,3 ha (área de reserva), **2.314,6** ha de franjas de protección entre parcelas de intervenidas.

El diseño propuesto para las áreas de reserva forestal tiene el objetivo de mantener una cobertura boscosa lo más equilibrada posible y regularmente distribuida dentro del predio, de tal forma que pueda desempeñar un rol preponderante en la protección ambiental, principalmente en el amortiguamiento de la fuerza y los efectos negativos del viento norte predominante en esta zona.

Cada fracción de reserva forestal será protegida con alambradas perimetrales, de modo a evitar la intromisión del ganado dentro de ellas. Así mismo; se contempla el emplazamiento de calles circunvalatorias, las cuales serán mantenidas permanentemente limpias, con el propósito de disminuir los riesgos de incendio del bosque.

Implementación de Pastura

Para la adecuación del bosque al uso con sistema silvopastoril, la vegetación del predio será sometida a acciones de cambio. El desarrollo consistirá en la eliminación de la vegetación leñosa arbustiva y sub arbustiva componente del estrato inferior del bosque y su sustitución por vegetación herbácea, gramíneas y leguminosas forrajeras. Los individuos del estrato superior, árboles de valor biológico y comercial, serán conservados la mayor cantidad posible dentro de la parcela, ocasionándose de esta manera alteración de baja intensidad al ecosistema actual de bosque. Las especies de árboles más frecuentes son: quebracho blanco, Algarroillo, Algarrobo y labón.

Los espacios liberados de la vegetación arbustiva serán ocupados por gramíneas forrajeras, generándose la consociación Arbórea: Herbácea e integrado al Sistema silvopastoril. Los árboles, a más de conservar el ecosistema de bosque, aportarán los beneficios propios del mismo: protección ambiental y contribución al proceso productivo y aportarán los beneficios referentes a la conservación y mejoramiento del suelo y del agua; prevención de la salinización del suelo, mitigación de manifestaciones extremas de elementos climáticos, temperaturas muy altas o bajas; conservación de hábitat de animales silvestres, producción de semillas para la multiplicación (Semillero) y conservación de las especies. La vegetación herbácea, las plantas forrajeras, constituirá la base alimenticia del ganado.

Superficie y ubicación

Serán establecidas hasta completar **2.872,7** ha de pastura cultivada bajo el uso del sistema de manejo silvopastoril en un plazo de 2 años. La ubicación de estas pasturas está indicada en el mapa de uso alternativo de la tierra.

Especies

Las especies de plantas forrajeras a ser implantadas son las que demostraron mayor adaptación, persistencia y productividad en la zona. Se consideran al pasto Gatton panic y Tanzania (*Panicum maximun*), como las principales especies recomendadas para la zona, y en carácter exploratorio el Calopogonium (*Calopogonium mucunoides*) consociado con esta, esta última leguminosa forrajera de efecto muy importante como mejorador del suelo (fijación de nitrógeno atmosférico y mejoramiento de la permeabilidad). Otras especies con posibilidades productivas para la zona son el pasto Estrella, *Bracchiaria brizantha*, Leucaena y variedades de sorgos forrajeros y graníferos.

Adecuación del bosque al uso y manejo al sistema silvopastoril

Para la adecuación del bosque al uso con tendencia al sistema silvopastoril, la vegetación del predio será sometida a acciones de cambio. El desarrollo consistirá en la eliminación de la vegetación leñosa arbustiva y sub arbustiva componente del estrato inferior del bosque y su sustitución por vegetación herbácea, gramíneas y leguminosas forrajeras. Los individuos del estrato superior, árboles de valor biológico y comercial, serán conservados la mayor cantidad posible dentro de las parcelas, ocasionándose de esta manera alteración de baja intensidad al ecosistema actual de bosque. Las especies de árboles más frecuentes son: quebracho blanco, palo santo, coronillo y labón.

Los espacios liberados de la vegetación arbustiva serán ocupados por gramíneas forrajeras, generándose la consociación Arbórea: Herbácea e integrado al Sistema silvopastoril. Los árboles, a más de conservar el ecosistema de bosque, aportarán los beneficios propios del mismo: protección ambiental y contribución al proceso productivo y aportarán los beneficios referentes a la conservación y mejoramiento del suelo y del agua; prevención de la salinización del suelo, mitigación de manifestaciones extremas de elementos climáticos, temperaturas muy altas o bajas; conservación de hábitat de animales silvestres, producción de semillas para la multiplicación (Semillero) y conservación de las especies. La vegetación herbácea, las plantas forrajeras, constituirá la base alimenticia del ganado.

A los efectos de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el **Decreto 18.831/86 “Que Establece Normas de Protección del Medio Ambiente”**, la habilitación de bosque será efectuado en fracciones iguales o menores que 100 (cien) hectáreas, conservando entre cada fracción franjas de bosque nativo de 100 (cien) metros de ancho. Las distribuciones de las franjas de protección serán de 100 metros preferentemente cada 500 metros en sentido norte-sur, la longitud transversal será de 2.000 metros en sentido este-oeste. Para este caso otra de las alternativas será de **1000 m x 1000 m y 100 ha cada parcela** a ser habilitada para pasturas.

Las fracciones tendrán preferentemente forma rectangular y las franjas más largas de bosque nativo matricial se orientarán de Este a Oeste. No se tiene prevista la quema de la masa vegetal de residuo. Las franjas de bosque nativo desempeñan el papel de separación entre las fracciones contiguas, serán aisladas del resto del terreno mediante fajas corta fuego, que podrán ser abiertas con topadoras.

Las pasturas serán implantadas conforme a la distribución espacial indicada en el “**mapa de uso alternativo de la tierra**” (Ver anexo). El desarrollo de pasturas cultivadas corresponde a un Nivel Tecnológico II. Detalles del proceso de establecimiento y manejo de la pastura se presenta a continuación:

Siembra

La siembra del pasto se efectuará durante el proceso de habilitación de la tierra, la eliminación del sotobosque. Para Tal fin la sembradora al voleo ya irá montada sobre la parte trasera de la cabina de la topadora.

Época : septiembre – diciembre
Método : Al voleo
Densidad : Gatton Panic: 6 a 7kg./ha VC: 36%

Control de malezas

No se prevé la aplicación de prácticas de control de malezas en la etapa de la implantación de la pastura.

Infraestructura de manejo

Apotrerramiento

Por el carácter intensivo del sistema de producción al cual está destinado este recurso; los potreros serán pequeños; entre 50 y 100 ha. como máximo para la ganadería de recría y engorde y de tamaños mayores, más de 400 ha, en la ganadería de cría. La forma de los potreros será cuadrada.

Aguadas

Construcción de tanques australianos y bebederos con flotadores y válvulas automáticas.

Recostaderos

Cada potrero tendrá áreas cubiertas por vegetación arbórea—en este caso fracciones de bosque nativo que quedan en los potreros como franjas de

protección entre parcelas del sistema silvopastoriles, para que sirva de abrigo al ganado, protección contra el calor, el frío y lluvias.

Corrales y Retiros

Se habilitarán retiros y corrales a fin de ocupar el predio en su mayor extensión, proteger los intereses de la finca y ejecutar las prácticas de manejo del ganado y de los potreros propios del proceso productivo.

Manejo de ganado y de pastura.

Sistema de producción

Las pasturas cultivadas serán utilizadas en un Nivel Tecnológico II y serán dedicadas a la cría, recría y engorde semi intensivos.

Prácticas de manejo de ganado

Compra de desmamante, ingreso de animales al sistema, control de peso de entrada, baños contra parásitos externos, tratamientos con antiparasitarios internos, vacunaciones, carga de potreros, rodeos frecuentes y posteriores ventas

Elección de razas

Se deberá optar por razas o cruza caracterizadas por alta fertilidad y habilidad materna (Hereford-Angus), temperamento tranquilo (Hereford), tolerante al calor (Brahman). Terneros con alta eficiencia de conversión de alimentos, precoces y alta calidad del producto. Se deberá optar por el Braford o **Brangus**. No se deja de optar por el Nelod.

Prácticas de manejo de pastura

Deberán incluir el control de la carga animal, en este caso la carga es de 0,9 a 1,2 UA/ha, control de balance carga-receptividad animal-mensual, control de quema, suplementación mineral, suplementación invernal, control de malezas, descanso de potreros, sistema de pastoreo y otras prácticas de manejo de la pradera.

Pastoreo Inicial

La pastura sembrada en época apropiada completa su crecimiento vegetativo y reproductivo en abril-mayo. Posterior al fructificación (semillas). Se recomienda el pastoreo inicial. En esta práctica ya se debe tener en cuenta la carga y el sistema de pastoreo.

Carga

La receptividad de las pasturas en esta región está determinada, principalmente, por el régimen de lluvias. La receptividad anual varía entre 0,9 y 1,2 Unidad Animal por hectárea. En cada potrero de 100 ha se deberían cargar de 90 a 120 novillos de 400 a 450 kilos.

Sistema de pastoreo

Por la intensidad del sistema de producción, se recomienda el sistema de pastoreo rotativo, con 4 potreros por lote, con 7 días de pastoreo y 20 a 25 días de descanso.

Control de malezas

Probablemente la invasión de malezas en los potreros, juntamente con la falta de pasto en periodos de sequías sean los dos aspectos más serios en la producción ganadera en esta región. Se deben tomar medidas para protegerse de estas limitaciones. La invasión de malezas es lenta y en pequeña cantidad cuando la carga en los potreros está ajustada a la receptividad. En este caso, siempre existe alta cobertura del suelo y pasto alto; ambas condiciones desfavorables para la germinación y crecimiento de malezas. Las malezas que aparezcan deben ser eliminadas en su etapa inicial de invasión. Se recurren a métodos físicos, extracción de raíz con palas o corte con machete, o físico-químico, corte con machete o rotativa y pulverización con herbicidas específicos.

Forrajes suplementarios

En periodos invernales y/o de sequías prolongadas ocurren falta de forraje. Esto ocasiona serios daños al animal y a la pastura. Uno de los métodos más eficientes de corregir esta limitación es la suplementación del ganado con forraje voluminoso, en este caso el heno del pasto enfardado constituye probablemente la mejor opción. Por este motivo en el proceso de desarrollo de las pasturas ya se deben habilitar parcelas que serán sometidas a la henificación. También ya se tienen que prever la adquisición de las maquinarias y equipos necesarios.

Uso alternativo de la tierra

En principio se ha hecho una inversión en lo que podría denominarse como Planificación. Este hecho, permitió identificar qué áreas serán destinadas para protección, dejando las porciones de bosque nativo que permanecerán como reserva y cuales se destinarán para desarrollo y producción. En la Tabla 6 se presenta los detalles de la planificación del uso de la tierra del presente plan.

Tabla 9. Uso Alternativo de la Tierra

USO	SUPERFICIE	
	ha	%
Bosque de Reserva	7.281,2	21,9
Campo natural	4.153,0	12,5
Franjas de separación	4.644,1	14,0
Pastura implantada	12.475,1	37,6
Bosque de protección	488,9	1,5
Area a habilitar	2.872,7	8,6
Regeneración P/franjas	400,8	1,2
Regeneración P/cauces	354,1	1,1
Sistema de riego artificial	217,0	0,7
Caminos, sede, tajamares	287,4	0,9
TOTAL	33.174,3	100,0

Bosque de reserva: El Uso alternativo de la Tierra previsto en el Plan contempla que de las **33.174,3** ha que posee la finca, **7.281,2** ha (21,9% del bosque original) quedaran como área no intervenida o área de reserva. El área de reserva cumplirá la función de refugio y hábitat de la fauna silvestre y banco de germoplasma de la vegetación nativa. También cumplirá la función de regulador de manifestaciones climáticas extremas.

Área a habilitar (Implantación de Pastura): Superficies asignadas a habilitar para uso bajo manejo de sistema silvopastoril contemplan **2.872,8** ha, el 8,6 % del predio. Esta superficie constituye el recurso básico y fundamental del proyecto ya que constituirá la base de la explotación ganadera.

Franjas de separación (protección eólica): El plan tiene asignado una superficie de **4.644,1** ha, el 14,0 % del predio que permanecerá como franjas de protección eólica y resguardo para animales entre parcelas desarrolladas. El área a intervenir representa el 8,6% de la superficie total del predio, mientras que las superficies no intervenidas, el área de reserva, las franjas de protección representan el 35,9%.

Las infraestructuras, representadas por los caminos principales y secundarios, así como las viviendas, corrales, bretes, tajamares, etc. no se cuantifican por separado, puesto que los mismos forman parte integrante de cada uno de los usos asignados.

Por otra parte se tiene que de un modo general existen medidas citadas en bibliografías para **atenuar los impactos que se verifiquen en actividades semejantes** y son las que se presentan en la tabla siguiente.

Tabla 10. Algunas medidas de protección ambiental previstas en el plan.

Actividad de desarrollo	Medidas
Habilitación de la tierra	Eliminación del sotobosque con maquinaria especial. Evitar el arrastre de la capa superficial del suelo. Dejar la mayor cantidad posible de árboles. Materiales leñosos producto de limpieza hilerar en colleras. Evitar la quema de los productos del desmonte. Evitar destronque en suelos susceptibles a salinización (Gleysol–Cambisol). Dejar franjas de protección entre parcelas intervenidas.
Siembra	Proceder a la siembra de las semillas durante el proceso de limpieza a los efectos de evitar la permanencia de suelo desnudo.
Pastoreo	Limitar el número de animales. Controlar la duración del pastoreo en las áreas específicas. Mezclar las especies de ganado para optimizar el uso de la pastura. Cortar y transportar forraje Ubicar estratégicamente las fuentes de agua y sal. Restringir el acceso del ganado a las áreas más degradadas Tomar medidas como resiembra de pasto.
Uso de fertilizante inorgánico	Implementar medidas de fertilización inorgánica estratégica conforme a datos provenientes de análisis de suelos
Utilización de aguas a través de aguadas	Desarrollar la cantidad apropiada de fuentes de agua Ubicar, estratégicamente, las fuentes de agua Controlar el uso de las fuentes de agua (según número de animales y la temporada del año). Clausurar las fuentes permanentes de agua cuando estén disponibles los charcos y los ríos temporales
Protección de la fauna nativa	Planificar e implementar las estrategias de manejo de los terrenos de pastoreo (la selección de las especies, el número de animales, las áreas de pastoreo) para reducir el impacto negativo en la fauna. Establecer refugios compensatorios para la fauna. Investigar el manejo organizado de la fauna, como ganado, que puede ayudar a proteger los recursos silvestres.
Destrucción de hábitat	Conservar la diversidad genética en el sitio (proteger las especies silvestres en su hábitat natural, mantener la diversidad dentro de las poblaciones) y fuera del sitio (p. ej. preservar el material genético en los “bancos”)
Quema	Implementar programas de quema bien planificados y controlados. El presente plan no contempla la quema.
Salinización	Evitar el desmonte de ciertos bosques. Dejar la mayor cantidad de árboles en áreas intervenidas para la ganadería. Evitar el represamiento de aguas en áreas susceptibles. Evitar el sobrepastoreo y la quema.
Roturación indiscriminada de la tierra	Acciones pro conservación del suelo a nivel estructural y de vegetación. Labranza mínima.
Ampliación de área para implantación de pastura	Enriquecimiento del bosque natural mediante el ínter siembra con especies nativas. Forestación de áreas descubiertas.

Indicadores y sitios de muestreo

En la Tabla siguiente se presentan algunos indicadores y sitios de muestreo propuestos en el proyecto para el seguimiento de la ejecución del mismo.

Tabla 11. Algunos indicadores y sitios de muestreo propuestos para el Proyecto

Recurso afectado	Efecto	Indicador	Sitio de muestreo
Suelo	Erosión	Cambios en el espesor del suelo. Cambios en la cantidad de sólidos suspendidos en los cuerpos del agua. Contenido de materia orgánica. Propiedades físico - químicas del suelo. Rendimiento de las pasturas. Localización, extensión y grado de compactación. Retención de humedad. En las áreas desmontadas y en las con pasturas implantadas. • la condición del suelo (es decir, las señales de mayor erosión, compactación, menor fertilidad, etc.);	En las áreas donde se establecieron pasturas artificiales en uso. Muestreo en transecto de los potreros.
Agua superficial	Cambios en la calidad.	Característica físico-químicas: pH, sólidos suspendidos, turbidez, PO4, NO3, NO2. Cambios en la estructura y dinámica poblacional de las comunidades acuáticas	En tajamares, tanques australianos, bebederos, y cercanías de puntos de agua.
Pastura	Degradación	<ul style="list-style-type: none"> • las tendencias del pasto (el sentido del cambio de la condición del terreno de pastoreo); • la condición de los terrenos de pastoreo (evaluación de la condición actual de salud del pasto, comparada con su potencial); • la disponibilidad y acceso del forraje natural, el cultivado y los alimentos importados (para animales de pesebre); • los cambios externos en el uso de la tierra y los cambios demográficos que afectan los recursos de pastoreo y a los ganaderos; 	En las áreas de pastura implantada. En los potreros, los puntos de muestreo se determinan al azar en transectos.
Fuentes de agua	Destrucción	<ul style="list-style-type: none"> • las fuentes de agua (su ubicación, condición, intensidad de uso y la condición de la vegetación a su alrededor) 	En las fuentes de agua. Tajamares y bebederos.
Ganado	Variación de producción estimada	<ul style="list-style-type: none"> • la condición del ganado (su peso, la presencia de enfermedades, y otros índices sanitarios); • la condición corporal de diferentes lotes. • los números y tipos de animales; • su distribución y movimiento temporal; • la productividad del ganado 	En los rodeos En registros contables
Hábitat	Destrucción	<ul style="list-style-type: none"> • los cambios en las poblaciones y hábitat de la fauna debido a la producción ganadera. 	En áreas de reserva y en áreas colindantes al predio
Población cercana	Cambios en hábitos, costumbres, actividad económica.	"Nuclerización" de poblados. Ingresos monetarios. Niveles de nutrición. Índices sanitarios. Acceso a servicios públicos. Aceptación y capacidad de adaptación a nuevas técnicas de manejo del ganado. <ul style="list-style-type: none"> • los cambios en la organización social; • las condiciones del mercado (cambios de precio, desarrollo de mercados alternativos, etc.); • los cambios en los índices económicos de los ganaderos (por ejemplo, el nivel de ingresos y la salud). 	Poblados cercanos al proyecto, identificados como sensibles por las alteraciones. Personales involucrados directamente en las actividades de desmonte y manejo del ganado.

A n e x o s

Mapa de uso actual
Mapa de uso alternativo
Imagen satelital

Equipo de técnicos:

Ing. Ftal. Elvio Cáceres Flecha

Ing. Agr. Néstor Cáceres Flecha

ANEXOS